


Prescripción farmacéutica en diabetes ARAGÓN 2020

PRESCRIPCIÓN EN PACIENTES CON DIABETES

Al **90 %** de los diabéticos atendidos en Aragón (75.558 personas) se les prescribió algún antidiabético en 2020



Mayor prescripción de Metformina, iDPP4, iSGLT2 en hombres


Mayor prescripción de insulina y arGLP1 en mujeres

Al **22 %** de los diabéticos se les prescribió metformina en monoterapia.


La metformina fue la primera prescripción en el **83%** de nuevos casos de DM2.

PRESCRIPCIÓN CON BENEFICIO POSITIVO EN LAS COMORBILIDADES DEL PACIENTE CON DIABETES


DM2 + Enfermedad renal crónica



DM2 + Enfermedad cardiovascular



Insuficiencia cardiaca congestiva



→ Mayor prescripción de iSGLT2 y de arGLP1 en hombres que en mujeres con diabetes y comorbilidades

PRÁCTICAS NO RECOMENDADAS O DE DUDOSO VALOR

Polimedicación

843 pacientes diabéticos tuvieron al menos cuatro fármacos antidiabéticos prescritos de manera concomitante.

Inercia terapéutica

El **33,5 %** de diabéticos menores de 75 años con HbA1c > 8% (1.100) no tuvieron ningún cambio en el tratamiento en los 90 días tras la determinación.

Prescripción en ancianos diabéticos

Al **4 %** de ancianos con diabetes (1.413) se les prescribió alguna sulfonilurea distinta a la glicazida.

836 ancianos con diabetes y HbA1c < 7% tenían prescritos un mínimo de tres fármacos antidiabéticos